Biotope und ökologische Nischen in Kleingartenanlagen

Tabelle 3: Die häufigsten Heckensträucher, ihre Standortbedingungen und die Bedeutung als Nahrungsquelle für Vögel (nach verschiedenen Quellen zusammengefaßt)

Name	I. Standortbedingungen		II. Früchte als Vogelnahrung	III.	
	Nährstoffgehalt	Wasserversorgung		Schnittverträglichkeit	Stockausschlagfähigkeit
Brombeere	± bis –	± bis +	++	±	+
Hartriegel	+	+ bis –	+	–	–
Haselnuß	+ bis ±	+ bis ±	–	–	+
Heckenrose	± bis +	±	++	±	–
Holunder	+	±	++	–	+
Kornelkirsche	± bis +	+ bis –	++	±	–
Kreuzdorn	± bis +	± bis –	+	–	–
Pfaffenhütchen	+ bis ±	±	+	+	–
Schlehe	± bis +	– bis ±	+	+	+
Schneeball	± bis +	± bis +	+++	±	–
Weißdorn	+ bis –	+ bis ±	+++	+	–

Bedeutung der Symbole:
Nährstoffgehalt: + nährstoffreich, – nährstoffarm, ± mittel
Wasserversorgung: + feucht, – trocken, ± mittel
Früchte als Vogelnahrung: – keine starke Bedeutung, + gelegentlich genutzt, ++ regelmäßig genutzt, +++ stark genutzt
Schnittverträglichkeit und Stockausschlagfähigkeit: + gut geeignet, ± möglich, – eher nicht geeignet